clínica do coração do alentejo

ECODOPPLER CARDÍACO

Exame Nº.: 309462 **Data:** 2019-09-05 **Hora:** 19:10 **Video Nº.**
Nº de Utente do SNS: 494264949 **Subsistema de Saúde:** ARS-ÉVORA - MAIA **Nº de Beneficiário:** 494264949
Nome: ROSARIA MARIA CARRASCO CATITA
Médico Requisitante:
Sexo: F **Idade:** 86 Anos **Peso:** 50 kg. **Altura:** 1.48 m **Sup. Corp.:** 1.42 m²
Residência:R DA JUVENTUDE Nº 24, . 7000-000 EVORA **Telefone:**
Informação Clínica: Avaliação cardíaca de rotina
Qualidade Técnica do Estudo: Boa

(Valores normais no adulto entre parêntesis)

AURÍCULA ESQUERDA:
Diâmetro: **41** (20 a 40 mm) **29** (12 a 22 mm/m²)

AURÍCULA DIREITA: **Normal**

SEPTO INTER-AURICULAR: **Normal**

VENTRÍCULO ESQUERDO:
Diâmetro: Diastólico: **46** (30 a 56 mm) **32** (19 a 32 mm/m²)
Sistólico: **29** (26 a 42 mm)
Fracção de Encurtamento: **37%** (>28%)
Fracção de Ejecção: **%** (>55%)

VENTRÍCULO DIREITO:
Diâmetro: (10 a 26 mm) (4 a 14 mm/m²)

PAREDES VENTRICULARES:
Espessura do Septo Inter-Ventricular: **12** (5 a 11 mm)
Espessura da Parede Posterior: **10** (7 a 11 mm)
Índice de Massa Vent. Esq.: **127** (<=95/m² M: <=115 g/m² H)

RAIZ DA AORTA:
Diâmetro: **30** (20 a 34 mm)

ARTÉRIA PULMONAR: **Normal**

VÁLVULA MITRAL: **Anormal**
Gradiente Máx.: (<5 mmHg)
Área Anatómica: Funcional: (3 a 6 cm²)
Regurgitação: **Sim** A>E: **Não**

VÁLVULA AÓRTICA: **Anormal**
Abertura Sistólica: **16** (15 a 25 mm)
Gradiente Máx.: **13** (<10) Méd.:
Área: (2 a 3 cm²)
Regurgitação: **Sim**

VÁLVULA TRICÚSPIDE: **Normal**
Gradiente Máx.: (<5) Área Funcional: (3 a 6 cm²)
Diâmetro do Anel: (<4)
Regurgitação: **Sim**
Pressão Sist. na Art. Pulmonar: **45** (<30)

VÁLVULA PULMONAR: **Normal**
Gradiente Máx.: (<10)
Regurgitação: **Não**

DERRAME DO PERICÁRDIO: **Não**
MASSAS INTRA-CAVITÁRIAS: **Não**
VEIA CAVA INFERIOR: **Normal**

Relatório Clínico

Ligeira a moderada fibrocalcificação do anel e dos folhetos mitrais, principalmente do folheto posterior, mantendo boa abertura. Em doppler observa-se regurgitação mitral moderada.
Ligeiro espessamento das cúspides aórticas, com boa abertura. Em doppler observa-se regurgitação aórtica minor.

Dilatação da aurícula esquerda. Restantes cavidades de dimensões normais (de acordo com superfície corporal).

Ausência de alterações segmentares de contractilidade.

Boa função sistólica global.

Ligeira hipertrofia do septo interventricular. Restantes paredes ventriculares de espessura normal.

Regurgitação tricúspide ligeira, inferindo-se hipertensão pulmonar ligeira (PSAP=45mmHg).

(O Técnico)
VANDA POSDEMINA

(O Médico Cardiologista)
ANGELA BENTO