



ECODOPPLER CARDÍACO

Exame Nº.: 309443

Data: 2019-09-05

Hora: 09:40

Video Nº.

Nº de Utente do SNS: 494537645

Subsistema de Saúde: ARS-ÉVORA - MAIA

Nº de Beneficiário: 494537645

Nome: LIDIA MARIA LOURINHA

Médico Requisitante:

Sexo: F

Idade: 89 Anos

Peso: 53 kg.

Altura: 1.62 m

Sup. Corp.: 1.55 m²

Residência:RUA JOÃO BRANCO PAIVA N1, . 7090-000 ALCAÇOVAS

Telefone:

Informação Clínica:

Qualidade Técnica do Estudo: Boa

(Valores normais no adulto entre parêntesis)

AURÍCULA ESQUERDA: Diâmetro: 48 (20 a 40 mm) 31 (12 a 22 mm/m²) AURÍCULA DIREITA: Normal SEPTO INTER-AURICULAR: Normal VENTRÍCULO ESQUERDO: Diâmetro: Diastólico: 38 (30 a 56 mm) 24 (19 a 32 mm/m²) Sistólico: 20 (26 a 42 mm) Fracção de Encurtamento: 47% (>28%) Fracção de Ejecção: % (>55%) VENTRÍCULO DIREITO: Diâmetro: (10 a 26 mm) (4 a 14 mm/m²) PAREDES VENTRICULARES: Espessura do Septo Inter-Ventricular: 10 (5 a 11 mm) Espessura da Parede Posterior: 10 (7 a 11 mm) Índice de Massa Vent. Esq.: 75 (<=95/m² M: <=115 g/m² H) RAIZ DA AORTA: Diâmetro: 28 (20 a 34 mm) ARTÉRIA PULMONAR: Normal	VÁLVULA MITRAL: Anormal Gradiente Máx.: (<5 mmHg) Área Anatômica: Funcional: (3 a 6 cm²) Regurgitação: Sim A>E: Sim VÁLVULA AÓRTICA: Anormal Abertura Sistólica: 16 (15 a 25 mm) Gradiente Máx.: 9 (<10) Méd.: Área: (2 a 3 cm²) Regurgitação: Sim VÁLVULA TRICÚSPIDE: Normal Gradiente Máx.: (<5) Área Funcional: (3 a 6 cm²) Diâmetro do Anel: (<4) Regurgitação: Sim Pressão Sist. na Art. Pulmonar: (<30) VÁLVULA PULMONAR: Normal Gradiente Máx.: (<10) Regurgitação: Não
	DERRAME DO PERICÁRDIO: Não MASSAS INTRA-CAVITÁRIAS: Não VEIA CAVA INFERIOR: Normal

Relatório Clínico

Ligeiro espessamento dos folhetos mitrais mantendo boa abertura. Regurgitação mitral ligeira.

Ligeiro espessamento das cúspides aórticas sem comprometimento da abertura sistólica. Regurgitação aórtica ligeira.

Dilatação da aurícula esquerda. Restantes cavidades de dimensões normais.

Ausência de alterações segmentares de contractilidade.

Boa função sistólica global.

Ligeira hipertrofia subaórtica do septo interventricular (13mm).

Regurgitação tricúspide ligeira, não se inferindo hipertensão pulmonar significativa.

Imagem hipocogénica visível sob a parede posterior do ventrículo esquerdo podendo traduzir pequeno derrame pericádico ou gordura subepicárdica.

(O Técnico)
LISA SPINOLA

(O Médico Cardiologista)
JOÃO VASCONCELOS